



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
www.reckeweg.de

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum

aerazol do nosa, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 10 ml roztworu izotonicznego zawiera: Calcium carbonicum Hahnemanni D12 2,5 ml, Hydrargyrum sulfuratum rubrum D8 2,5 ml, Kalium bichromicum D6 2,5 ml, Pulsatilla pratensis D6 2,5 ml.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum aerazol do nosa jest lekiem homeopatycznym stosowanym w ostrym katarze.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum

Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum:

Jeśli pacjent ma uczulenie na chrom lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dzieci i młodzież: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum

Zalecana dawka to: Dorośli jedno naciśnięcie rozpylacza (1 dawka) do każdego otworu nosowego 3-5 razy dziennie.

Po otwarciu butelki nie stosować leku dłużej niż 6 tygodni.

Długość okresu stosowania leku nie jest ograniczona, jednakże leki homeopatyczne nie powinny być stosowane przez długi okres czasu bez porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum
Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana nie powoduje wystąpienia działań ubocznych.

Pominięcie zastosowania leku Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia ślinienia się lub innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza.

Wskazówka: W początkowej fazie stosowania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku stosowanie leku należy przerwać i zasięgnąć porady lekarza.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.


6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum


- Substancjami czynnymi leku są: Calcium carbonicum Hahnemanni D12, Hydrargyrum sulfuratum rubrum D8, Kalium bichromicum D6 i Pulsatilla pratensis D6.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: chlorek sodu, woda do wstrzykiwań, etanol, laktoza.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® Pulsatilla Compositum i co zawiera opakowanie


Zaopatrzone w rozpylacz opakowanie zawiera 15 ml bezbarwnego roztworu leczniczego, który należy stosować zgodnie z następującym opisem:



zjąć zakrętkę



naciskać na dno pojemnika
aż pojawi się mgiełka
z rozpylonego leku



wsunąć nasadkę do
otworu nosowego
i ponownie nacisnąć

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy
tel.: +49 6251 1097-0 / fax: +49 6251 3342
e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA
Barska 33 - 02-315 Warszawa
tel.: 22 823 34 78
faks: 22 822 66 43
e-mail: polypharm@polypharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2016