



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
www.reckeweg.de

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® syrop

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 100 ml syropu zawiera: Ammonium causticum D6 0,1 ml, Atropa bella-donna D6 0,5 ml, Bryonia D6 0,5 ml, Cephaelis ipecacuanha D6 1,0 ml, Chamomilla recutita D2 0,3 ml, Corallium rubrum D10 1,0 ml, Cuprum aceticum D10 1,0 ml, Dactylopius coccus D5 1,0 ml, Drosera D6 0,5 ml, Thymus vulgaris D2 0,3 ml.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® jest lekiem homeopatycznym stosowanym w kaszlu towarzyszącym chorobom przeziębieniowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®

Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®: Nie stosować leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® w przypadku uczulenia na rumianek, tymianek lub którykolwiek inny składnik leku wymieniony w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku uporczywego, utrzymującego się kaszlu, odkrztuszania ropnej płwociny, duszności, gorączki należy zasięgnąć porady lekarza.

Wskazówka: W przypadku jakichkolwiek niejasnych i nagle pojawiających się dolegliwości należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagające diagnozy i pomocy lekarskiej.

Dzieci poniżej 12 lat: Ze względu na zawartość alkoholu i z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie podawać leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® dzieciom poniżej 12 lat.

Młodzież powyżej 12 lat: Ze względu na zawartość alkoholu przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® należy poradzić się lekarza.

Lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na zawartość alkoholu nie stosować leku w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® zawiera niewielką ilość alkoholu (etanolu). Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem wywiera mało istotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek zawiera etanol i sacharozę

Lek ten zawiera 13 % (v/v) alkoholu. Wraz z zażyciem 1 łyżeczki (5 ml) leku wprowadza się do organizmu każdorazowo do 0,5 g alkoholu, co odpowiada 13 ml piwa lub 5 ml wina. Wywodzi się stąd ryzyko zdrowotne dla

pacjentów z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, osób z uszkodzeniami mózgu, kobiet ciężarnych i dzieci. Działanie innych leków może ulec ograniczeniu lub nasileniu.

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję na niektóre cukry, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Wskazówka dla cukrzyków: 1 łyżeczka (ok. 5 ml) zawiera do 2 g sacharozy, co odpowiada ok. 0,17 WW (wymiennika węglowodanowego).

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Zżywać doustnie 3 razy dziennie: dorośli po 1 łyżeczce (ok. 5 ml), młodzież powyżej 12 roku życia po pół łyżeczki (ok. 2,5 ml) syropu. Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zażywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Wskazówka: W początkowej fazie zażywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku stosowanie leku należy przerwać i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie zażywać leku Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin®

- Substancjami czynnymi leku są: Ammonium causticum D6, Atropa bella-donna D6, Bryonia D6, Cephalis ipecacuanha D6, Chamomilla recutita D2, Corallium rubrum D10, Cuprum aceticum D10, Dactylopius coccus D5, Drosera D6, Thymus vulgaris D2.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: sacharoza, karmel, etanol, woda oczyszczona.
- Lek zawiera 13 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R8 Jutussin® i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła barwnego z dozownikiem i nakrętką zawiera 150 ml roztworu leczniczego w kolorze brązowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33

02 - 315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: polypharm@polypharm.com.pl

www.polypharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2016