



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
www.reckeweg.de

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® R1

krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 10 g roztworu zawiera: Apis mellifica D4 1 g, Atropa bella-donna D4 1 g, Calcium iodatum D4 1 g, Hydrargyrum bichloratum D12 1 g, Kalium bichromicum D4 0,01 g, Phytolacca americana D4 1 g, Teucrium marum D6 1 g.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R1 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R1
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R1
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R1
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R1 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R1 jest lekiem homeopatycznym stosowanym pomocniczo w bólach gardła.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R1

Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R1:

Nie stosować leku przy nadwrażliwości na chrom lub na którykolwiek ze składników leku.

Ze względu na zawartość składnika Calcium iodatum, w przypadku schorzeń tarczycy nie stosować leku bez zasięgnięcia porady lekarza.

Ze względu na zawartość składnika Apis mellifica nie należy stosować leku u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy objawach ropienia migdałków podniebiennych z utrudnionym otwieraniem jamy ustnej, przy duszności, gorączce, ropnej płwocinie, jak też przy utrzymujących się i niejasnych dolegliwościach należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenia wymagające diagnozy i pomocy lekarskiej.

Uwaga dodatkowa: Pojedyncza dawka leku (5 kropli) zawiera niewielką ilość alkoholu (mniej niż 100 mg).

Dzieci poniżej 12 roku życia: Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R1 u dzieci nie zaleca się jego stosowania poniżej 12 roku życia.

Lek Dr. Reckeweg® R1 a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Interakcje z innymi lekami są nieznanne.

Wskazówka ogólna: Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

Cięża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Lek Dr. Reckeweg® R1 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R1

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: Zażywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zażywać rzadziej.

Dzieci poniżej 12 roku życia: Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R1

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż tydzień powinno być skonsultowane z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R1

Objawy przedawkowania nie są znane. Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R1

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zażywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R1 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia niżej wymienionych objawów niepożądanych należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza:

- wzmożone wydzielanie śliny spowodowane związkami rtęci Hydrargyrum bichloratum.
- reakcje skórne spowodowane składnikiem Kalium bichromicum (pojedyncze przypadki).

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówka: W początkowej fazie zażywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R1

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zażywać leku Dr. Reckeweg® R1 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R1

- Substancjami czynnymi leku są: Apis mellifica D4, Atropa bella-donna D4, Calcium iodatum D4, Hydrargyrum bichloratum D12, Kalium bichromicum D4, Phytolacca americana D4, Teucrium marum D6.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.
- Lek zawiera 38 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R1 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml bezbarwnego roztworu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: polypharm@polypharm.com.pl

www.polypharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2016