



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
www.reckeweg.de

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### Dr. Reckeweg® R14

krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

**Substancje czynne:** 10 g roztworu zawiera: Avena sativa D1 1 g, Coffea arabica D4 1 g, Eschscholzia californica D2 1 g, Humulus lupulus D2 1 g, Passiflora incarnata D2 1 g, Valeriana officinalis TM=D1 1 g, Zincum isovalerianicum D6 1 g.

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R14 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R14
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R14
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R14
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R14 i w jakim celu się go stosuje**

Dr. Reckeweg® R14 jest lekiem homeopatycznym stosowanym pomocniczo w leczeniu zaburzeń snu.

#### **2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R14**

##### **Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R14:**

Nie stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wymienionych w punkcie 6.

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

W przypadku utrzymujących się zaburzeń snu lub jakichkolwiek niejasnych i nagle pojawiających się dolegliwości należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagające diagnozy i pomocy lekarskiej.

**Uwagi dodatkowe:** Lek ten zawiera 66 % (v/v) alkoholu. Wraz z zażyciem pojedynczej dawki leku (5 kropli) wprowadza się do organizmu do 135 mg alkoholu, co odpowiada 3,4 ml piwa lub 1,4 ml wina. Wywodzi się stąd ryzyko zdrowotne dla pacjentów z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, osób ze schorzeniami mózgu, kobiet ciężarnych, kobiet karmiących i dzieci. Działanie innych leków może ulec ograniczeniu lub nasileniu.

**Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia:** Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R14 u dzieci i młodzieży nie zaleca się jego stosowania poniżej 18-go roku życia.

**Lek Dr. Reckeweg® R14 a inne leki:** Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami są nieznanne.

**Wskazówka ogólna:** Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

**Cięża i karmienie piersią:** Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:** Lek Dr. Reckeweg® R14 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

### **3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R14**

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli: Zazywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zazywać rzadziej. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

### **Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R14**

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż tydzień powinno być uprzednio skonsultowane z lekarzem.

### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R14**

Objawy przedawkowania nie są znane.

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

### **Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R14**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zazywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R14 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówka: W początkowej fazie zazywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zazywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

#### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R14**

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie zazywać leku Dr. Reckeweg® R14 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

#### **Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R14**

- Substancjami czynnymi leku są: Avena sativa D1, Coffea arabica D4, Eschscholzia californica D2, Humulus lupulus D2, Passiflora incarnata D2, Valeriana officinalis TM=D1, Zincum isovalerianicum D6.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.
- Lek zawiera 66 % (v/v) etanolu.

#### **Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R14 i co zawiera opakowanie**

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml roztworu leczniczego o zabarwieniu bladeżółtym do szaro-żółtego.

#### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: [info@reckeweg.de](mailto:info@reckeweg.de)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: [polypharm@polypharm.com.pl](mailto:polypharm@polypharm.com.pl)

[www.polypharm.com.pl](http://www.polypharm.com.pl)

**Data ostatniej aktualizacji ulotki:** 06/2016