



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
www.reckeweg.de

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### Dr. Reckeweg® R25

krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

**Substancje czynne:** 10 g roztworu zawiera: Chimaphila umbellata D3 1 g, Conium maculatum D5 1 g, Ferrum picricinum D4 1 g, Pareira brava D2 1 g, Populus tremuloides D3 1 g, Pulsatilla pratensis D3 1 g, Serenoa repens D2 1 g.

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R25 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R25
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R25
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R25
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### 1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R25 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R25 jest lekiem homeopatycznym stosowanym do łagodzenia trudności w oddawaniu moczu, np. towarzyszących łagodnemu przerostowi prostaty.

#### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R25

##### Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R25:

Nie stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wymienionych w punkcie 6.

##### Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku trudności w opróżnianiu pęcherza moczowego, przed zażyciem leku należy zwrócić się do lekarza celem wyjaśnienia przyczyn dolegliwości.

W przypadku pojawienia się krwi lub śluzu w moczu, zatrzymania moczu lub jakichkolwiek niejasnych i nagle pojawiających się dolegliwości należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagające diagnozy i pomocy lekarskiej.

**Uwaga dodatkowa:** Lek ten zawiera 56 % alkoholu. Wraz z zażyciem pojedynczej dawki leku (5 kropli) wprowadza się do organizmu do 112 mg alkoholu, co odpowiada 2,9 ml piwa lub 1,2 ml wina. Wywodzi się stąd ryzyko zdrowotne dla pacjentów z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, osób ze schorzeniami mózgu, kobiet ciężarnych, kobiet karmiących i dzieci. Działanie innych leków może ulec ograniczeniu lub nasileniu. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

**Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia:** Lek Dr. Reckeweg® R25 nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

**Lek Dr. Reckeweg® R25 a inne leki:** Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Interakcje z innymi lekami są nieznanne.

**Wskazówka ogólna:** Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

**Cięża i karmienie piersią:** Lek Dr. Reckeweg® R25 nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:** Lek Dr. Reckeweg® R25 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

### 3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R25

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli mężczyźni: Zżywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zżywać rzadziej.

### Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R25

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza.

### Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R25

Objawy przedawkowania nie są znane.

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

### Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R25

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zżywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R25 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówka: W początkowej fazie zżywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zżywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

#### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### 5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R25

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie zżywać leku Dr. Reckeweg® R25 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

### 6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R25

- Substancjami czynnymi leku są: Chimaphila umbellata D3, Conium maculatum D5, Ferrum picricum D4, Pareira brava D2, Populus tremuloides D3, Pulsatilla pratensis D3, Serenoa repens D2.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.
- Lek zawiera 56 % (v/v) etanolu.

#### Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R25 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml roztworu leczniczego o zabarwieniu pastelowo-żółtym.

#### Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: [info@reckeweg.de](mailto:info@reckeweg.de)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: [polypharm@polypharm.com.pl](mailto:polypharm@polypharm.com.pl)

[www.polypharm.com.pl](http://www.polypharm.com.pl)

**Data ostatniej aktualizacji ulotki:** 06/2016