



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
www.reckeweg.de

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® R55

krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 10 g roztworu zawiera: Arnica montana D3 1 g, Calendula officinalis D3 1 g, Hamamelis virginiana D4 1 g, Ruta graveolens D6 1 g, Symphytum officinale D6 1 g, Toxicodendron quercifolium D6 1 g.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R55 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R55
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R55
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R55
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R55 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R55 jest lekiem homeopatycznym stosowanym do złagodzenia dolegliwości w lekkich zranieniach (otarcia naskórka, zadrapania).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R55

Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R55:

Nie stosować leku Dr. Reckeweg® R55 przy nadwrażliwości na sumaka jadowitego (Toxicodendron quercifolium), arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae) zwanej dawniej rodziną złożonych (Compositae) lub na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy utrzymujących się krwawieniach, gorączce, stanach ropnych, ograniczonej ruchomości stawów, jak też w przypadku niejasnych lub pojawiających się nowych dolegliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga dodatkowa: Pojedyncza dawka leku (5 kropli) zawiera niewielką ilość alkoholu (mniej niż 100 mg).

Dzieci poniżej 12 roku życia: Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R55 u dzieci nie zaleca się jego stosowania poniżej 12 roku życia.

Lek Dr. Reckeweg® R55 a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami są nieznanne.

Wskazówka ogólna: Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające a i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek Dr. Reckeweg® R55 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R55

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: Zażywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zredukować częstotliwość zażywania do 2 razy dziennie po 5 kropli. Dzieci poniżej 12 roku życia: Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R55

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R55

Objawy przedawkowania nie są znane.

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R55

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zażywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R55 może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić reakcje wynikające z nadwrażliwości na składnik leku Arnika lub Calendula, np. reakcje skóry (zaczerwienienie, swędzenie). W przypadku pojawienia się w/w lub innych objawów niepożądanych należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Wskazówka: W początkowej fazie zażywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R55

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie zażywać leku Dr. Reckeweg® R55 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R55

- Substancjami czynnymi leku są: Arnica montana D3, Calendula officinalis D3, Hamamelis virginiana D4, Ruta graveolens D6, Symphytum officinale D6, Toxicodendron quercifolium D6.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.
- Lek zawiera 47 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R55 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml bezbarwnego roztworu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: polypharm@polypharm.com.pl

www.polypharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2016