



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
www.reckeweg.de

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® R2

krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 10 g roztworu zawiera: Aconitum napellus D6 1 g, Arnica montana D3 1 g, Aurum chloratum D6 1 g, Crataegus TM 0,5 g, Selenicereus grandiflorus D4 1 g.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R2 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R2
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R2
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R2
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R2 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R2 jest lekiem homeopatycznym stosowanym pomocniczo w dolegliwościach ze strony serca na tle nerwicowym, takich jak kołatanie serca i kłucia w okolicy serca.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R2

Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R2:

Nie stosować leku przy nadwrażliwości na Arnikę, na inne rośliny astrowate (Asteraceae / Compositae) lub na którykolwiek ze składników leku.

W przypadku chorób serca nie należy stosować leku bez porady lekarskiej ani nie zażywać w zastępstwie innych leków zaleconych przez lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymujących się lub nasilających się dolegliwości, jak również bólów w okolicy serca, które mogą promieniować do ramion, nadbrzusza lub okolicy szyi, w przypadku duszności lub dolegliwości związanych ze stanami lękowymi, mdłościami, wymiotami, występowaniem potu, należy natychmiast zwrócić się do lekarza celem wyjaśnienia ich przyczyny.

Uwaga dodatkowa: Pojedyncza dawka leku (5 kropli) zawiera niewielką ilość alkoholu (mniej niż 100 mg).

Dzieci poniżej 12 roku życia: Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R2 u dzieci nie zaleca się jego stosowania poniżej 12 roku życia.

Lek Dr. Reckeweg® R2 a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Interakcje z innymi lekami są nieznanne.

Wskazówka ogólna: Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

Cięża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn: Lek Dr. Reckeweg® R2 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R2

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: Zazywać doustnie do 6-ciu razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zredukować częstotliwość zazywania do 3 razy dziennie po 5 kropli.

Dzieci poniżej 12 roku życia: Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R2

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R2

Objawy przedawkowania nie są znane. Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R2

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zazywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R2 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia alergicznych reakcji skóry wywołanych składnikami Arnika (rzadkie przypadki), należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówka: W początkowej fazie zazywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zazywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R2

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zazywać leku Dr. Reckeweg® R2 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R2

- Substancjami czynnymi leku są: Aconitum napellus D6, Arnica montana D3, Aurum chloratum D6, Crataegus TM, Selenicereus grandiflorus D4.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.
- Lek zawiera 42 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R2 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml roztworu leczniczego o lek-
kim żółtym lub brązowo-żółtym zabarwieniu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: polypharm@polypharm.com.pl

www.polypharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2016