



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
www.reckeweg.de

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### Dr. Reckeweg® R11

#### krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

**Substancje czynne:** 10 g roztworu zawiera: Berberis vulgaris D4 1 g, Calcium phosphoricum D12 1 g, Causticum Hahnemanni D6 1 g, Rhododendron D4 1 g, Solanum dulcamara D4 1 g, Toxicodendron quercifolium D4 1 g.

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R11 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R11
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R11
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R11
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### 1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R11 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R11 jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodzeniu dolegliwości reumatycznych.

#### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R11

##### Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R11:

Nie stosować leku Dr. Reckeweg® R11 przy nadwrażliwości na sumaka jadowitego (Toxicodendron quercifolium) lub na którykolwiek ze składników leku.

##### Ostrzeżenia i środki ostrożności

W ostrych stanach z zaczerwienieniem, obrzękiem lub podwyższoną temperaturą stawów, jak również przy utrzymujących się, niejasnych lub nagle pojawiających się dolegliwościach należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagające diagnozy i pomocy lekarskiej.

**Uwaga dodatkowa:** Pojedyncza dawka leku (5 kropli) zawiera niewielką ilość alkoholu (mniej niż 100 mg).

**Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia:** Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R11 u dzieci i młodzieży nie zaleca się jego stosowania poniżej 18 roku życia.

**Lek Dr. Reckeweg® R11 a inne leki:** Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami są nieznanne.

**Wskazówka ogólna:** Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

**Cięża i karmienie piersią:** Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:** Lek Dr. Reckeweg® R11 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

### 3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R11

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli: Zżywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zżywać rzadziej. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

### Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R11

Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza.

### Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R11

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić u nadwrażliwych pacjentów objawy spowodowane obecnością składników Rhododendron i Toxicodendron quercifolium, takie jak podrażnienie błon śluzowych jamy ustnej, gardła i przewodu pokarmowego z mdłościami, wymiotami, biegunką, uczuciem zawrotu głowy, oszołomienia oraz stany zapalne skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

### Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R11

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zżywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

### 4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R11 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych lub reakcji skóry mogących pojawić się także wiele dni po zastosowaniu leku wskutek zawartości składnika Toxicodendron quercifolium (bardzo rzadkie przypadki) lub w przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówka: W początkowej fazie zżywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zżywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

#### Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### 5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R11

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie zżywać leku Dr. Reckeweg® R11 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

### 6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R11

- Substancjami czynnymi leku są: Berberis vulgaris D4, Calcium phosphoricum D12, Causticum Hahnemanni D6, Rhododendron D4, Solanum dulcamara D4, Toxicodendron quercifolium D4.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.
- Lek zawiera 38 % (v/v) etanolu.

#### Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R11 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml bezbarwnego roztworu leczniczego.

#### Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: [info@reckeweg.de](mailto:info@reckeweg.de)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: [polypharm@polypharm.com.pl](mailto:polypharm@polypharm.com.pl)

[www.polypharm.com.pl](http://www.polypharm.com.pl)

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2016