



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
www.reckeweg.de

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® R73

krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 10 g roztworu zawiera: Acidum sulfuricum D6 2 g, Argentum metallicum D12 1 g, Arnica montana D4 2 g, Bryonia D4 2 g, Causticum Hahnemanni D12 1 g, Ledum palustre D3 2 g.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R73 i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R73
3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R73
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R73
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R73 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg® R73 krople jest lekiem homeopatycznym stosowanym w dolegliwościach spowodowanych chorobą zwyrodnieniową stawów (artrozą).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R73

Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R73:

Nie stosować leku Dr. Reckeweg® R73 przy nadwrażliwości na arnikę lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae) zwanej dawniej rodziną złożonych (Compositae) lub na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku ostрых dolegliwości z zaczerwienieniem, obrzękiem i podwyższoną temperaturą stawów, oraz przy utrzymujących się i nawracających dolegliwościach należy zwrócić się do lekarza.

Uwaga dodatkowa: Pojedyncza dawka leku (5 kropli) zawiera niewielką ilość alkoholu (mniej niż 100 mg).

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R73 u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Lek Dr. Reckeweg® R73 a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami są nieznanne.

Wskazówka ogólna: Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

Cięża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn: Lek Dr. Reckeweg® R73 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R73

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli: Zazywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R73

Długość okresu zazywania leku nie jest ograniczona, jednakże leki homeopatyczne nie powinny być stosowane przez dłuższe okresy czasu bez porady lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R73

W przypadku zacycia większej dawki leku niż zalecana, u wrażliwych osób mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe z wymiotami, jak też biegunka ze skurczami wywołane składnikami Bryonia i Ledum palustre. W takim przypadku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R73

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zazywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcją lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® R73 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia alergicznych reakcji skóry spowodowanych obecnością składnika leku Arnica montana lub innych objawów niepożądanych należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Wskazówka: W początkowej fazie zazywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przejściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zazywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C - PL-02-222 Warszawa

tel.: 22 49 21 301

faks: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R73

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zazywać leku Dr. Reckeweg® R73 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R73

- Substancjami czynnymi leku są: Acidum sulfuricum D6, Argentum metallicum D12, Arnica montana D4, Bryonia D4, Causticum Hahnemanni D12, Ledum palustre D3.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.
- Lek zawiera 46 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R73 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml bezbarwnego lub lekko żółtego roztworu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy

tel.: +49 6251 1097-0

faks: +49 6251 3342

e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

POLYPHARM SA

Barska 33 - 02-315 Warszawa

tel.: 22 823 34 78

faks: 22 822 66 43

e-mail: polypharm@polypharm.com.pl

www.polypharm.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2016